

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
ใบแนบเรื่อง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘		
☐ ขอดูเรื่องเดิม	☐ โปรดเวียนเรื่อง	☐ โปรดดำเนินเรื่องนี้
☐ โปรดชี้แจง	☐ โปรดให้ความเห็น	☐ โปรดเก็บเรื่อง
☐ โปรดแก้ไขให้ถูกต้อง	☐ โปรดมาพบเพื่อหารือ	☐ โปรดลงนาม
☒ โปรดดูหมายเหตุ		

- หมายเหตุ
- กรมควบคุมโรค ได้แจ้งคำแนะนำการให้วัคซีนโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข ตามกลุ่มอายุ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้แจ้งไปยัง สสจ.ทุกแห่งแล้ว
 - เห็นควรมอบ CSO ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ และ กำกับติดตาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....*Uma*.....

นางสาวนาถฤดี ศิรินาม
นักวิชาการสาธารณสุข

....๒๕ มกราคม ๒๕๖๖...

นันทา สุขผ่อง
(นางสาวรัชชดา สุขผ่อง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- ☐ ชอบ
- ☐ ดำเนินการ
- ☐ แจ้ง
- ☒ มอบ.....*lso*.....

[Signature]
(นายเจริญ จันทน์บุตร)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค โทร. ๐ ๒๕๕๖ ๓๑๔๖ - ๗

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว. ๓๓

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

ห้องผู้ตรวจราชการ เขต
เลขรับ 164
วันที่รับ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖
วันที่ออก 10.13

เรื่อง คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒ (๘)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ และยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้วัคซีนโควิด 19 เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชาชนไทย จากการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีมติให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. กำหนดการให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีอายุ ๖ เดือน - ๕ ปี กำหนดให้วัคซีน Pfizer ฝาสีแดง จำนวน ๓ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๑ และ ๒ ห่างกัน ๔ - ๘ สัปดาห์ และระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และ ๓ ห่างกันอย่างน้อย ๘ สัปดาห์ ทั้งนี้ยังไม่มีคำแนะนำการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในขณะนี้

๒. กำหนดการให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีอายุ ๕ - ๑๑ ปี

๒.๑ วัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม จำนวน ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๑ และ ๒ ห่างกัน ๔ - ๘ สัปดาห์

๒.๒ วัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๓ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และ ๓ ห่างกัน ๓ เดือน

๒.๓ วัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๓ และ ๔ ห่างกัน ๔ เดือนขึ้นไป

๓. กำหนดการให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี

๓.๑ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง จำนวน ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๑ และ ๒ ห่างกัน ๔ สัปดาห์

๓.๒ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๓ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และ ๓ ห่างกัน ๓ เดือน

๓.๓ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๓ และ ๔ ห่างกัน ๔ เดือนขึ้นไป

๔. กำหนดการให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป

๔.๑ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง

๔.๑.๑ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง จำนวน ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๑ และ ๒ ห่างกัน ๔ สัปดาห์

๔.๑.๒ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๓ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และ ๓ ห่างกัน ๓ เดือน

๔.๑.๓ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง หรือวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๓ และ ๔ ห่างกัน ๔ เดือนขึ้นไป

๔.๒ วัคซีน AstraZeneca

๔.๒.๑ วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๑ และ ๒ ห่างกัน ๘ สัปดาห์

๔.๒.๒ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง หรือวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๓ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และ ๓ ห่างกัน ๓ เดือน

๔.๒.๓ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๓ และ ๔ ห่างกัน ๔ เดือนขึ้นไป

๔.๒.๔ กรณีผู้ประสงค์รับเฉพาะวัคซีน AstraZeneca ชนิดเดียว ให้เว้นระยะห่างระหว่างวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๒ และวัคซีน AstraZeneca เข็มกระตุ้น เป็นเวลา ๖ เดือน - ๑ ปี (เร็วที่สุด ๓ เดือน กรณีมีการระบาด)

๔.๒.๕ กรณีผู้ที่เคยรับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นครั้งที่ ๑ แล้ว การจะได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นครั้งที่ ๒ ควรเว้นระยะห่าง ๖ เดือน - ๑ ปี (เร็วที่สุด ๔ เดือน กรณีมีการระบาด)

๔.๓ วัคซีนสูตรไขว้ AstraZeneca - Pfizer ฝาสีม่วง

๔.๓.๑ วัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๑ และวัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง เป็นเข็มที่ ๒ ระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๑ และ ๒ ห่างกัน ๔ สัปดาห์

๔.๓.๒ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง หรือวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๓ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และ ๓ ห่างกัน ๓ เดือน

๔.๓.๓ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง หรือวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๓ และ ๔ ห่างกัน ๔ เดือนขึ้นไป

๕. ผู้ที่มีประวัติเคยเป็นโควิด 19 มาก่อน ในกรณีที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน หรือเคยฉีดมาก่อน เพียง ๑ เข็ม ควรให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น หลังจากเป็นโรคประมาณ ๓ เดือน กรณีที่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน อย่างน้อย ๒ เข็ม ให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังจากเป็นโรค อย่างน้อย ๖ เดือน

๖. ในกรณีอื่น ๆ สามารถพิจารณาให้วัคซีนตามความสมัครใจและความจำเป็นอื่น ๆ ภายใต้อดุลพินิจของแพทย์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้แจ้งการดำเนินงานดังกล่าวไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ทราบ เห็นชอบ มอบ

(นายณรงค์ สายวงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☒ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘
☒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
☒ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๘
☒ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ ๘
☐ อื่น ๆ.....

(นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

๒๕ มิ.ค. ๒๕๖๖



คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข

ผ่านมติการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 9 ธันวาคม 2565
มติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 21 ธันวาคม 2565
และมติการประชุมติดตามสถานการณ์ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ธันวาคม 2565

กลุ่มเป้าหมาย	เข็มที่ 1	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 2	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 3 (กระตุ้นครั้งที่ 1)	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มกระตุ้น
ผู้ที่มีอายุ 6 เดือน - 4 ปี	Primary series - Pfizer ฝาสีแดง 3 เข็ม, เข็มที่ 1 และ 2 ห่างกัน 4-8 สัปดาห์, เข็มที่ 2 และ 3 ห่างกันอย่างน้อย 8 สัปดาห์						เข็มที่ 4 (กระตุ้นครั้งที่ 2) ขึ้นไป
ผู้ที่มีอายุ 5 - 11 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	4-8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม	3 เดือน	Pfizer ฝาสีส้ม	4 เดือนขึ้นไป	Pfizer ฝาสีส้ม
ผู้ที่มีอายุ 12 - 17 ปี	Pfizer ฝาสีม่วง	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง	3 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เติมโดส/ครึ่งโดส	4 เดือนขึ้นไป	Pfizer ฝาสีม่วง
ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป	Pfizer ฝาสีม่วง	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง	3 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง	4 เดือนขึ้นไป	Pfizer ฝาสีม่วง หรือ AstraZeneca
	AstraZeneca (ทางเลือก)	8 สัปดาห์	AstraZeneca (ทางเลือก)	3 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง หรือ AstraZeneca ²	4 เดือนขึ้นไป	Pfizer ฝาสีม่วง
	AstraZeneca (ทางเลือก)	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง (ทางเลือก)	3 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง หรือ AstraZeneca	4 เดือนขึ้นไป	Pfizer ฝาสีม่วง หรือ AstraZeneca ³

1. ผู้ที่มีประวัติเคยเป็นโควิด 19 มาก่อน ในกรณีที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน หรือเคยฉีดวัคซีนมาก่อนเพียง 1 เข็ม ควรให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น หลังจากเป็นโรคประมาณ 3 เดือน, กรณีที่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนอย่างน้อย 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังจากเป็นโรคอย่างน้อย 6 เดือน
2. กรณีผู้ประสงค์รับเฉพาะวัคซีน AstraZeneca ชนิดเดียว ให้เว้นระยะห่างระหว่าง AstraZeneca เข็มที่ 2 และ AstraZeneca เข็มกระตุ้น เป็นเวลา 6 เดือน - 1 ปี (เร็วที่สุด 3 เดือน กรณีมีการระบาด)
3. กรณีผู้ที่เคยรับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นครั้งที่ 1 แล้ว การจะได้รับ AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นครั้งที่ 2 ควรเว้นระยะห่าง 6 เดือน - 1 ปี (เร็วที่สุด 4 เดือน กรณีมีการระบาด)
4. ในกรณีอื่น ๆ สามารถพิจารณาให้วัคซีนตามความสนใจและความจำเป็นอื่น ๆ ภายใต้อุปถัมภ์ของแพทย์
5. คำแนะนำนี้เป็นไปตามข้อมูลทางวิชาการในปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลการศึกษาวិจัยที่เพิ่มเติมในอนาคต