

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
เลขที่ 162  
วันที่ 7 ก.พ. 2566  
เวลา 09.58 น.



ห้องผู้ตรวจราชการ เขต  
เลขรับ 321  
วันที่รับ ๗ กพ  
วันที่ออก 12.06

๕๐

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘  
เลขรับ 497  
วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖  
เวลา 09.11

กองตรวจราชการ  
เลขรับ 1302  
วันที่ 6 กพ 2566  
เวลา 15.38

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๒๒๒ โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๗๗๑๖  
ที่ สธ.๐๔๑๐.๓/ว ๕๕ ..... วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง...การจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca Pfizer (ฝาสีม่วง) Pfizer (ฝาสีส้ม) และ Pfizer (ฝาสีแดง) สำหรับให้บริการแก่ คนไทย ชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รอบการจัดส่งเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๓

เนื่องด้วยสถานการณ์ในระยะที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ และยังมีการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้วัคซีนโควิด 19 เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชาชนไทย และตามมติที่ประชุมกำหนดมาตรการรองรับการเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขจัดระบบและกำหนดแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในแผนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในการรองรับผู้เดินทางระหว่างประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและมีการจัดสรรวัคซีนให้แก่หน่วยบริการตามข้อสนับสนุนมาแล้ว

กระทรวงสาธารณสุข ขอจัดส่งวัคซีนโควิด 19 AstraZeneca Pfizer (ฝาสีม่วง) Pfizer (ฝาสีส้ม) และ Pfizer (ฝาสีแดง) สำหรับให้บริการแก่ คนไทย ชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รอบการจัดส่งเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พิจารณาเร่งรัดการให้วัคซีนกับกลุ่มเป้าหมายทุกคนในประเทศไทย โดยการจัดส่งวัคซีนรอบนี้ ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในทุกกลุ่มเป้าหมายที่ครบกำหนดรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น รวมถึงการฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีแดงในกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๕ ปี สำหรับการฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่ ๑ และ ๒ โดยการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ ควรให้หลังจากการฉีดเข็มแรก ๔ สัปดาห์ แล้วตามด้วยการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ หลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ ไปแล้วอย่างน้อย ๘ สัปดาห์ ซึ่งจะได้มีการสำรวจความต้องการและจัดส่งวัคซีนสำหรับการฉีดเป็นเข็มที่ ๓ ต่อไป เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีน และเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวในประเทศไทย จึงขอให้หน่วยบริการพิจารณาเร่งรัดการให้วัคซีนกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบนพื้นฐานของความสมัครใจ โดยคิดค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ขอรับวัคซีนต้องลงนามในเอกสารแสดงความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน และลงนามยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน

อนึ่ง...

