

กลุ่มงานแผนการปฏิบัติการสุขภาพ
เลขที่ 218
วันที่ 15 มี.ค. 2566
เวลา 07.22



ห้องผู้ตรวจราชการ เขต
431
เลขรับ
วันที่รับ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖
วันที่ออก 16.35

CSO

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑
เลขรับ 1144
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา 08.09

บันทึกข้อความ

กองตรวจราชการ
เลขรับ 1925
วันที่ 16.08
วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๐๘

ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๒๒๒ โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๓๓๓๓

ที่ สธ ๐๔๑๐.๓/ว ๖๖๐ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Pfizer (bivalent)

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๓

เนื่องด้วยประเทศไทยได้รับมอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิด Pfizer (bivalent) จากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๕๐๑,๑๒๐ โดส และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุญาตให้กรมควบคุมโรคนำวัคซีน Pfizer (bivalent) เข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ (๕) การนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม เพื่อใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีคำแนะนำการฉีดวัคซีน Pfizer (bivalent) ได้แก่

๑. ให้ฉีดเป็นเข็มกระตุ้น กรณีผู้ที่มีประวัติได้รับวัคซีนโควิด 19 มาแล้วอย่างน้อย ๒ เข็ม โดยเข็มที่ ๓ มีระยะเวลาห่างจากเข็มที่ ๒ อย่างน้อย ๓ เดือน และเข็มที่ ๔ มีระยะเวลาห่างจากเข็มที่ ๓ อย่างน้อย ๔ เดือน

๒. ให้ฉีดเป็นเข็มกระตุ้น กรณีผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับวัคซีนโควิด 19 มาแล้วอย่างน้อย ๒ เข็ม แนะนำให้ฉีดวัคซีนหลังติดเชื้ออย่างน้อย ๖ เดือน

๓. ผู้ที่เคยได้รับ LAAB สามารถฉีดวัคซีน Pfizer (Bivalent) เมื่อใดก็ได้ สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน Pfizer (Bivalent) สามารถรับ LAAB ได้ หลังจากได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรง (๖๐๘) รวมถึงประชาชนทั่วไปภายใต้การบริหารจัดการของพื้นที่ สำหรับกรณีอื่น ๆ ให้พิจารณาตามความเสี่ยงและดุลพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษา โดยคำนึงถึงประโยชน์ ความเสมอภาค และความเป็นไปได้ เป็นสำคัญ โดยไม่อนุญาตให้ใช้วัคซีน Pfizer (Bivalent) ที่ได้รับบริจาคในการบริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อเก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ มีคำแนะนำการใช้วัคซีน Pfizer (Bivalent) ตามเอกสารกำกับยา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- (๑) วัคซีน Pfizer (Bivalent) เป็นวัคซีนชนิด ฝาสี่เทา
- (๒) ขนาดบรรจุ ๖ โดสต่อขวด (Multiple Dose Vial) ห้ามเจือจางก่อนใช้
- (๓) ขนาดการใช้ ๐.๓ มิลลิกรัมต่อโดส กำหนดให้ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ
- (๔) ให้ใช้วัคซีน Pfizer (Bivalent) ในกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป
- (๕) อายุวัคซีนขณะจัดเก็บที่อุณหภูมิ ๒ - ๘ องศาเซลเซียส ๑๐ สัปดาห์

กระทรวง...

กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการวัคซีนดังกล่าวจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานมาย กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งแผนจัดส่งวัคซีนโควิด 19 Pfizer (bivalent) สำหรับรอบการสำรวจประจำวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และคำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านทาง QR Code ท้ายหนังสือ และขอให้ติดตามกำกับให้รายงานผลการฉีดวัคซีนรายบุคคล จำนวนวัคซีนคงคลังประจำวัน ผ่านระบบติดตามการให้วัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข <https://cvp1.moph.go.th/> สำหรับอุปกรณ์การฉีดวัคซีนจะดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานต่อไป และได้มีหนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลายเซ็น)

(นายณรงค์ สายวงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



เอกสารประกอบหนังสือนำส่งวัคซีน

๑

ทราบ

เห็นชอบ มอบ

- ☐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘
- ☒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
- ☐ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๘
- ☐ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ ๘
- ☐ อื่น ๆ.....

☐ ขอบ

☐ ดำเนินการ

☒ แจ้ง

☒ มอบ CSO แก้ว ๗๕๕

(ลายเซ็น)

(นายปรามิทธิ์ เสงี่ยมรัตน์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖

(ลายเซ็น)

(นายเจริญ จันทมัตตุการ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

(ลายเซ็น)

นายวิวัฒน์ บาลนาค

นักวิชาการสาธารณสุข

(ลายเซ็น)

(นางสาวรัชดา สุขผึ้ง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

15 มี.ค. 2566