



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๒๒๒ โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๗๗๑๖

ที่ สธ ๐๔๑๐.๓/ว ๒๔๕๕ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง...การจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Moderna (bivalent) รอบการจัดส่ง
เดือนเมษายน ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒

เนื่องด้วยประเทศไทยได้รับมอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Moderna (bivalent) จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน ๑,๐๐๐,๒๐๐ โดส และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุญาตให้กรมควบคุมโรคนำวัคซีน Moderna (bivalent) เข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๑๓ (๕) การนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ ป้องกันหรือบำบัดโรค สภาวิชาชีพ และองค์การเภสัชกรรม เพื่อใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จากที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ มีคำแนะนำการฉีดวัคซีน Moderna (bivalent) ได้แก่

๑. ให้ฉีดเป็นเข็มกระตุ้น กรณีผู้ที่มิประวัติได้รับวัคซีนโควิด 19 มาแล้วอย่างน้อย ๒ เข็ม โดยเข็มที่ ๓ มีระยะเวลาห่างจากเข็มที่ ๒ อย่างน้อย ๓ เดือน และเข็มที่ ๔ มีระยะเวลาห่างจากเข็มที่ ๓ อย่างน้อย ๔ เดือน

๒. ให้ฉีดเป็นเข็มกระตุ้น กรณีผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับวัคซีนโควิด 19 มาแล้วอย่างน้อย ๒ เข็ม แนะนำให้ฉีดวัคซีนหลังติดเชื้ออย่างน้อย ๖ เดือน

๓. ผู้ที่เคยได้รับ LAAB สามารถฉีดวัคซีน Moderna (Bivalent) เมื่อใดก็ได้ สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับ วัคซีน Moderna (Bivalent) สามารถรับ LAAB ได้ หลังจากได้รับวัคซีนอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ โดยแนะนำให้ฉีดในกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงต่อโรครุนแรง รวมถึงประชาชนทั่วไปภายใต้การบริหารจัดการของพื้นที่ สำหรับกรณีอื่น ๆ ให้พิจารณาตามความเสี่ยงและดุลพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษา โดยคำนึงถึงประโยชน์ ความ เสมอภาค และความเป็นไปได้ เป็นสำคัญ โดยไม่อนุญาตให้ใช้วัคซีน Moderna (Bivalent) ที่ได้รับบริจาคใน การบริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อเก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ มีคำแนะนำการใช้วัคซีน Moderna (Bivalent) ตามเอกสารกำกับยา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- (๑) วัคซีน Moderna (Bivalent) พร้อมใช้โดยไม่ต้องผสมน้ำยาทำลาย
- (๒) ขนาดบรรจุ ๕ โดสต่อขวด (Multiple Dose Vial)
- (๓) ขนาดการใช้ ๐.๕ มิลลิลิตรต่อโดส กำหนดให้ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ
- (๔) ให้ใช้วัคซีน Moderna (Bivalent) ในกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป
- (๕) อายุวัคซีนขณะจัดเก็บที่อุณหภูมิ -๕๐ ถึง -๑๕ องศาเซลเซียส มีอายุจนถึงวันหมดอายุ ของวัคซีน และที่อุณหภูมิ ๒ - ๘ องศาเซลเซียส มีอายุ ๓๐ วัน

กระทรวงสาธารณสุข...

๔. กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการวัคซีนดังกล่าวจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งแผนจัดส่งวัคซีนโควิด 19 Moderna (bivalent) รอบการจัดส่งเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ สำหรับรอบการสำรวจ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยสามารถดาวน์โหลดแผนการจัดส่งวัคซีน Moderna (Bivalent) รอบการจัดส่งเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ และเอกสารกำกับยา จาก QR Code ท้ายหนังสือ และขอให้ติดตามกำกับให้รายงานผลการฉีดวัคซีนรายบุคคล จำนวนวัคซีนคงคลังประจำวัน ผ่านระบบติดตามการให้วัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข <https://cvp1.moph.go.th/> สำหรับอุปกรณ์การฉีดวัคซีนจะดำเนินการจัดส่งให้หน่วยงานต่อไป และได้มีหนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นายณรงค์ สายวงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

