



กลุ่มโรคติดต่อ
วันที่ ๑๔
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๖
เวลา ๑๕.๒๕ น.
วาม

กลุ่มโรคติดต่อ
วันที่ ๑๔
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๖
เวลา ๑๕.๒๕ น.

ที่ สร ๐๔๐๑๔/ว ๒๖๕ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้ดำเนินการเร่งรัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ช่วงฤดูฝน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒

ตามหนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ สธ ๐๔๑๑.๔/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ขอให้ดำเนินการเร่งรัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ช่วงฤดูฝน พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังกล่าว ไปยังประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้ว นั้น

กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง ขอให้ ท่าน ดำเนินการเร่งรัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค
ไข้เลือดออก ช่วงฤดูฝน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT) วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เพื่อแจ้งเตือนให้พื้นที่จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย และการสร้างความ

- ☐ ผู้อำนวยการ ตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน

☐ รองผู้อำนวยการ ๒. พิจารณาเปิด EOC ระดับเขตสุขภาพ เมื่อมีจังหวัดที่เข้าเกณฑ์เปิด EOC จำนวน ๓

☐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จังหวัดหรือมากกว่า

☐ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และวิจัย

☐ สื่อสารประชาสัมพันธ์ ๓. สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา

☐ ระบาดวิทยา ๔. ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการประชุม dead case conference กรณี

☐ พัฒนาระบบและเสียชีวิตทุกราย

☐ พัฒนาระบบควบคุมโรค ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ชุดตรวจใช้เลือดออกแบบรวดเร็ว (NS1 rapid test) ในหน่วยบริการ

☐ กองบริหารการแพทย์ปฐมภูมิ (รพ.สต.) เพื่อการยืนยันผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกอย่างรวดเร็ว

☐ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ ๖. สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ความรู้ เตือนเรื่องการติดเชื้อโรคในผู้ใหญ่ และแจ้งเตือน

☐ สาขาสังคมสงเคราะห์ คลินิก ร้านขายยา ให้ระมัดระวังในการจ่ายยาในกลุ่ม NSAIDs (Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs)

☐ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ ๗. กำกับ ติดตาม และสนับสนุนให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการควบคุมโรค ให้ได้ตาม

☐ พัฒนาระบบและมาตรการ ๓-๓-๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

☒ ๘. ประเมินผล

☐ ๙. ประเมินผล

☐ โครงการการประกอบอาชีพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

1254 No. 12. 8 Nov

[illegible]

- หน้าที่ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ในการจัดทำรายงาน PM ของกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 81-83 ดำเนินการจัดทำรายงาน
ฉบับแรกและครั้งที่สองในการจัดทำรายงาน
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ
ของกรมการค้าภายใน และกรมการค้าต่างประเทศ

Полит. экон.

(นางสาวฉันทนา ผดุงทศ)

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อ

☒ ~~นำโดยแมลง~~ ☒ ~~ดำเนินการตามเสนอ~~
☐ ~~ทราบ~~ ☐ ~~อนุมัติ/อนุญาต~~
☐ ~~เห็นชอบ~~
☐ ~~ลงนามแล้ว~~

- NONW DHF (CD)

๘๘ พล.ต.ท. ๓๐๔๕
(นางศศิธร ตั้งสวัสดิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รักษาราชการแทน

ader

26 NOV

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๑.๔/ว ๖๖๕



คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้ดำเนินการเร่งรัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ช่วงฤดูฝน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๗/ว ๖๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการเร่งรัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกยังคงมีแนวโน้มสูงชันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พบผู้ป่วย ๑๔,๘๑๑ ราย จำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันถึง ๕.๗ เท่า และขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน มีปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรค อาจทำให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นได้ ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการและกลไกเร่งรัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้แจ้งสรุปมติการประชุมฯ ดังกล่าว ไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้ว นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ขอให้ท่านดำเนินการเร่งรัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ช่วงฤดูฝน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก และพิจารณาเปิด EOC ระดับจังหวัด หรือเขตกรณีเข้าเกณฑ์

๒. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ จัดทำแผนกิจกรรมจิตอาสาสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่สาธารณะของชุมชน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และรวบรวมผลการสำรวจเพื่อรายงานกรมควบคุมโรค

๓. ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT) วิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้ป่าอำเภอที่มีการระบาด และตำบล หมู่บ้านที่มีการระบาดต่อเนื่องเกินกว่า ๔ สัปดาห์ เพื่อแจ้งเตือนให้พื้นที่จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย และการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน

๔. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการ dead case conference กรณีเสียชีวิตทุกราย

๕. ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ชุดตรวจไข้เลือดออกแบบรวดเร็ว (NS1 rapid test) ในหน่วยบริการ

ปฐมภูมิ (รพ.สต.) เพื่อการยืนยันผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกอย่างรวดเร็ว

๖. สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ความรู้ เตือนเรื่องการติดเชื้อโรคในผู้ใหญ่ และแจ้งเตือนคลินิก ร้านขายยา ให้ระมัดระวังในการจ่ายยาในกลุ่ม NSAIDs (Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs)

๗. กำกับ ติดตาม สนับสนุนให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการควบคุมโรค ให้ได้ตามมาตรการ ๓-๓-๑

โดยประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ และดำเนินการตามมติประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมาย
นางสาวทิพย์รัตน์ ผลิใบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองโรคติดต่อฯ นำโดยแมลง
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๐๔ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๐๔

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๕๓๓

สำเนาส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

มาตรการเร่งรัดการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ข้อมูลจากรายงานเฝ้าระวังโรค กองระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม ๑๓,๙๘๗ ราย อัตราป่วย ๒๑.๑๔ ต่อประชากรแสนคน โดยพบจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน ๖.๒ เท่า มีผู้เสียชีวิตสะสม ๑๓ ราย จาก ๑๐ จังหวัด อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๐๙ โดยคาดว่าโรคไข้เลือดออกจะระบาดรุนแรงในปีนี้ เนื่องจาก

- ๑.๑ แนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา และจำนวนผู้ป่วยในระดับประเทศสูงเกินกว่าค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง โดยพบจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน ๖.๒ เท่า
- ๑.๒ พบการระบาดของขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้เกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเคลื่อนย้ายของประชากรสูง จึงทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ๑.๓ พบผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมด ๑๓ ราย เป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่า ๑๕ ปี ๙ ราย (ร้อยละ ๖๙) ซึ่งส่วนใหญ่ไปรักษาที่โรงพยาบาลซ้ำ มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง ได้แก่ โรคอ้วน (BMI > ๓๐ กก./ม.^๒) รับประทาน NSAIDs และติดสุรา
- ๑.๔ ผลสำรวจลูกน้ำยุงลายจากโปรแกรมทันรระบาดช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังพบค่า House index ในชุมชนสูงถึงร้อยละ ๑๒.๑๙ และจากโปรแกรม อสม./อสส.ออนไลน์ ยังพบค่า House index ในชุมชนสูงถึงร้อยละ ๗.๓๔

๒. มาตรการเร่งรัดการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื่องจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและจะระบาดรุนแรงในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง โดยกรมควบคุมโรคคาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยทั่วประเทศมากกว่า ๑๐,๐๐๐ รายต่อเดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคมนี้ จึงขอความร่วมมือทุกจังหวัดเร่งรัดการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๒.๑ ด้านการเฝ้าระวังโรค

- ๑) ทุกจังหวัดต้องมีทีมตระหนักรู้สถานการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ร่วมกับข้อมูลสำรวจลูกน้ำยุงลาย และผลการทดสอบความต้านทานของยุงต่อสารเคมี โดยชี้เป้าตำบลที่มีรายงานผู้ป่วยเกินกว่าค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง และมีการระบาดต่อเนื่องเกินกว่า ๒๘ วัน เป็นรายสัปดาห์ เพื่อเร่งรัดติดตามมาตรการควบคุมโรค
- ๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกไปยังนายอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกสัปดาห์ เพื่อขอรับการสนับสนุนเร่งรัดมาตรการควบคุมโรคจากท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๓) อสม./อสส. เพิ่มความเข้มข้นในการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ให้ครอบคลุมทุกสถานที่

๒.๒ ด้านการป้องกันควบคุมโรค

ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ๓-๓-๑ ได้ตามมาตรฐานอย่างเข้มข้น ดังนี้

๑) เมื่อพบผู้ป่วยรายแรกๆ ของหมู่บ้าน ให้ดำเนินการควบคุมยุงพาหะ ตามแนวทางดังตาราง

มาตรการ ๓,๓,๑-๓-๗-๑๔-๒๑-๒๘	
Day ๐ วันที่พบผู้ป่วย ยืนยัน	- รายงานโรคให้ รพ.สต. หรือสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ทราบภายใน ๓ ชั่วโมง - สอบสวนและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดสเปรย์กระพ่นกำจัดยุงตัวเต็มวัย ในบ้านผู้ป่วยภายใน ๓ ชั่วโมงหลังได้รับรายงาน
Day ๑	- สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ในบ้านผู้ป่วยและบ้านที่อยู่ในรัศมี ๑๐๐ เมตร จากบ้านผู้ป่วย และจุดที่สงสัยเป็นแหล่งโรค ภายใน ๑ วัน - ทำประชาคม เพื่อชี้แจงสถานการณ์ ให้สุศึกษาถึงการป้องกันตนเองและอาการที่ต้องเฝ้าระวัง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการร่วมกันในชุมชน - ศตม. พิจารณาเก็บตัวอย่างลูกน้ำและยุงลายส่งตรวจหาเชื้อในพาหะนำโรค - สสจ. และท้องถิ่นพิจารณาสนับสนุนชุดป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก (เช่น แผ่นพับความรู้โรคไข้เลือดออก สารทากันยุงกัด สเปรย์กำจัดยุง และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น) ในบ้านผู้ป่วย
Day ๓	- พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ในบ้านผู้ป่วยและบ้านที่อยู่ในรัศมี ๑๐๐ เมตร จากบ้านผู้ป่วย และจุดที่สงสัยเป็นแหล่งโรค (เพื่อฆ่ายุงลายที่มีเชื้อที่อาจยังหลงเหลืออยู่ และเพื่อฆ่ายุงรุ่นใหม่ที่เพิ่งเกิดไม่ให้ไปกินเลือดผู้ป่วยและแพร่โรคต่อไป)
Day ๗	- สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ในบ้านผู้ป่วยและบ้านที่อยู่ในรัศมี ๑๐๐ เมตร จากบ้านผู้ป่วย และจุดที่สงสัยเป็นแหล่งโรค (เพื่อฆ่ายุงลายที่มีเชื้อที่อาจยังหลงเหลืออยู่ และเพื่อฆ่ายุงรุ่นใหม่ที่อาจกินเลือดผู้ป่วยไปแล้วและกำลังบ่มเชื้ออยู่ในตัวให้ตายหมดไป) เป้าหมาย HI และ CI ในรัศมี ๑๐๐ เมตรจากบ้านผู้ป่วยเป็นศูนย์, ยุงที่มีเชื้อและยุงรุ่นใหม่ที่กำลังบ่มเชื้อในบ้านผู้ป่วยและบ้านที่อยู่ในรัศมี ๑๐๐ เมตรตายหมดไป (หลังจาก Day ๗ ให้คงมาตรการพ่นสารเคมีเสริมทุก ๗ วัน (Day ๑๔, Day ๒๑, Day ๒๘) ในและนอกบ้านผู้ป่วยและบ้านที่อยู่ในรัศมี ๑๐๐ เมตร จากบ้านผู้ป่วย และจุดที่สงสัยเป็นแหล่งแพร่โรคหากยังมีผู้ป่วยต่อเนื่อง จนกว่าการแพร่เชื้อ ณ จุดนั้นได้หยุดลง)
Day ๑๔	- สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในหมู่บ้านที่เกิดโรค - ตำบลที่พบผู้ป่วยหลายหมู่บ้าน ให้ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งตำบล เป้าหมาย HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ ๕ (พ่นสารเคมีเสริม ในและนอกบ้านผู้ป่วยและบ้านที่อยู่ในรัศมี ๑๐๐ เมตร จากบ้านผู้ป่วย และจุดที่สงสัยเป็นแหล่งแพร่โรคหากยังมีผู้ป่วยต่อเนื่อง จนกว่าการแพร่เชื้อ ณ จุดนั้นได้หยุดลง)
Day ๒๑	- สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในหมู่บ้านที่เกิดโรค เป้าหมาย HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ ๕, CI ของสถานพยาบาล โรงเรียนในตำบลเป็นศูนย์ และ CI ของศาสนสถาน โรงธรรม โรงงาน สถานที่ราชการ ไม่เกินร้อยละ ๕) - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินพื้นที่ที่ระบาดต่อเนื่องมากกว่า ๒ generations ว่ามีการดำเนินการมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

	(พ่นสารเคมีเสริม ในและนอกบ้านผู้ป่วยและบ้านที่อยู่ในรัศมี ๑๐๐ เมตร จากบ้านผู้ป่วย และจุดที่สงสัยเป็นแหล่งแพร่โรคหากยังมีผู้ป่วยต่อเนื่อง จนกว่าการแพร่เชื้อ ณ จุดนั้นได้หยุดลง)
Day ๒๘ เป็นต้นไป	- คงมาตรการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชนทุก ๗ วัน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม - (พ่นสารเคมีเสริม ในและนอกบ้านผู้ป่วยและบ้านที่อยู่ในรัศมี ๑๐๐ เมตร จากบ้านผู้ป่วย และจุดที่สงสัยเป็นแหล่งแพร่โรคหากยังมีผู้ป่วยต่อเนื่อง จนกว่าการแพร่เชื้อ ณ จุดนั้นได้หยุดลง)

หมายเหตุ-

๑. หากพบผู้ป่วยนอกรัศมี ๑๐๐ เมตรเดิม ภายใน ๒๘ วัน ให้พ่นสารเคมีทั้งกลุ่มบ้าน/หมู่บ้าน เพิ่มเติมจากรัศมี ๑๐๐ เมตร โดยให้ดำเนินการพ่นในวันที่ ๑, ๓, ๗ (หลังจาก Day ๗ ที่พ่นทั้งกลุ่มบ้าน/หมู่บ้าน ให้คงมาตรการพ่นสารเคมีเสริมทุก ๗ วัน จนกว่าการแพร่เชื้อในกลุ่มบ้าน/หมู่บ้าน จะหยุดลง)

๒. กรณีพื้นที่ระบาดต่อเนื่องไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการ ๓ - ๓ - ๑ ได้ทันให้ดำเนินการพ่นสารเคมีทั้งกลุ่มบ้าน/หมู่บ้าน เช่นกันโดยให้ดำเนินการพ่นในวันที่ ๑, ๓, ๗ (หลังจาก Day ๗ ที่พ่นทั้งกลุ่มบ้าน/หมู่บ้าน ให้คงมาตรการพ่นสารเคมีเสริมทุก ๗ วัน จนกว่าการแพร่เชื้อในกลุ่มบ้าน/หมู่บ้าน จะหยุดลง)

๓. หากมีฝนตกในช่วงที่มีการแพร่เชื้อในกลุ่มบ้าน/หมู่บ้าน หรือกำลังอยู่ในช่วงการระบาด ต้องรีบรณรงค์หรือแจ้งให้ประชาชนกำจัดขยะและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอื่นๆให้เสร็จภายใน ๗ วัน เนื่องจากฝนอาจทำให้มียุงเกิดใหม่มากขึ้น และยุงบางตัวอาจมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกที่ได้รับถ่ายทอดจากแม่ยุงที่ติดเชื้อได้ (transovarial transmission)

๒) กรณีพบผู้ป่วยต่อเนื่อง ให้พิจารณากระดับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- EOC ระดับอำเภอ เมื่อพบผู้ป่วยที่เป็นพื้นที่ระบาด* มากกว่าร้อยละ ๒๕ ของจำนวนตำบลในอำเภอ
- EOC ระดับจังหวัด เมื่อมีอำเภอที่เข้าเกณฑ์เปิด EOC มากกว่าร้อยละ ๒๕ ของจำนวนอำเภอในจังหวัด
- EOC ระดับเขตสุขภาพ เมื่อมีจังหวัดที่เข้าเกณฑ์เปิด EOC จำนวน ๓ จังหวัดหรือมากกว่า

หมายเหตุ *ตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาด หมายถึง ตำบลที่มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกินกว่าค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลังในช่วง ๕ สัปดาห์ล่าสุด และ มีการระบาดต่อเนื่องมากกว่า ๒๘ วัน (พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องกัน โดยวันที่พบผู้ป่วย (วันที่วินิจฉัยสงสัยไข้เลือดออก) ของผู้ป่วยแต่ละรายทั้งระยะกันไม่เกิน ๒๘ วัน และยังคงควบคุมโรคไม่ได้)

๓) เป้าหมายของการยกระดับ EOC คือ ลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ ราย อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินร้อยละ ๐.๑๐ และควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนให้ไม่เกิน ๕ หลังคาเรือนต่อการสำรวจ ๑๐๐ หลังคาเรือน (HI<๕)

๔) ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือดำเนินมาตรการควบคุมโรคในสถานที่สำคัญต่างๆ

๒.๓ ด้านการวินิจฉัยรักษา

- ๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดสรรชุดตรวจไข้เลือดออกแบบรวดเร็ว (NS1 rapid test) ให้ครอบคลุมในสถานบริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอระบาดโรคไข้เลือดออก
- ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานครสื่อสารไปยังสถานบริการสาธารณสุขทุกประเภท ใช้แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออก และ Dengue Chart ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- ๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดทำ Dead case conference ทุกราย และส่งผลการพิจารณากรณีเสียชีวิต มายังศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคไข้เลือดออก กรมควบคุมโรค ผ่านสำนักงานป้องกันควบคุมโรค และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

๒.๔ ด้านการสื่อสารความเสี่ยง

- ๑) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดทีมออกสื่อสารเชิงรุกไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน คลินิก ร้านขายยา ให้สามารถวินิจฉัยสงสัยโรคไข้เลือดออกอย่างรวดเร็ว โดยแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และอาการที่เข้าเกณฑ์วินิจฉัยโรคไข้เลือดออกและเกณฑ์ที่ต้องรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล รวมถึงให้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทาลาชันกันยุง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสจากยุงที่กัดผู้ป่วยแล้วนำไปสู่ผู้อื่นได้
- ๒) ใช้กลไกคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) และคลินิกโรคเรื้อรังในการสื่อสารเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ โรคอ้วน ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ถึงอาการป่วยที่ต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด การห้ามรับประทานยากลุ่ม NSAIDs และมาตรการ ๓ เก็บป้องกัน ๓ โรค