

การขับเคลื่อน งานสุขภาพจิตและ

สารเสพติด ประจำปี 2568

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ



หัวข้อการนำเสนอ



1 ผลการดำเนินงานตาม KPI

2 การวิเคราะห์สถานการณ์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปิงบประมาณ 2568

1

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

1.1 อัตราการฆ่าตัวตาย ≤ 7.8 ต่อประชากรแสนคน (4.54 ต่อแสนปชก.) 

1.2 ร้อยละของผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จลดลงจากปีที่ผ่านมา $\geq$ ร้อยละ 10

(ปี 67 26 คน ปี 68 19 คน คิดเป็นร้อยละ 73.07) 

1.3 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ $\geq$ ร้อยละ 35

(127 ราย ทำครบมาตรการ 53 ราย ร้อยละ 41.73) 

2

ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ได้รับการติดตามดูแลเฝ้าระวัง ตามแนวทางที่กำหนด (Workload) ร้อยละ 92

ร้อยละ 55.29 

3

ผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

ต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (เฉพาะสมัครใจ) (Retention Rate) (เป้าหมาย $\geq$ ร้อยละ 70)

ร้อยละ 91.22 


ข้อมูลที่บ้านกักในระบบที่มีการบันทึก V-CARE แยกจังหวัด อำเภอ (หน่วยนับ : คน)

อำเภอ	ประเภทความเสี่ยงและผลการคัดกรอง															รวมทั้งหมด					ไม่เสี่ยง	ทั้งหมด
	จิตเวช					ยาเสพติด					จิตเวชและยาเสพติด											
	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	รวม	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	รวม	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	รวม	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	รวม		
บึงโขงหลง	8	0	0	0	8	13	0	0	0	13	5	3	0	0	8	26	3	0	0	29	0	30
บุงคล้า	11	0	0	1	12	25	5	0	0	30	2	2	0	0	4	38	7	0	1	46	0	46
ปากคาด	140	17	2	5	164	133	5	1	1	140	68	49	5	5	127	341	71	8	11	431	0	431
พรเจริญ	87	4	1	0	92	35	3	0	0	38	9	4	0	2	15	131	11	1	2	145	1	146
ศรีวิไล	33	0	0	0	33	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24	57	0	0	0	57	0	57
เซกา	14	2	0	1	17	1	2	1	2	6	2	6	0	6	14	17	10	1	9	37	0	37
เมืองบึงกาฬ	1,168	6	0	0	1,174	205	2	3	1	211	216	16	4	13	249	1,589	24	7	14	1,634	1	1,639
โซพิสัย	83	0	0	0	83	13	0	0	4	17	13	0	2	0	15	109	0	2	4	115	0	115
	1,544	29	3	7	1,583	425	17	5	8	455	339	80	11	26	456	2,308	126	19	41	2,494	2	2,501


หมายเหตุ แสดงตามผลการประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง (OAS) ครั้งล่าสุดตามช่วงวันที่1 ต.ค2566.-18พ.ค.2568

การวิเคราะห์สถานการณ์


ฆ่าตัวตายสำเร็จ



ทำร้ายตัวเองด้วยวิธี




จำแนกเพศ



จำนวนฆ่าตัวตายสำเร็จแยกรายอำเภอ

รวม 19 ราย



จำแนกตามกลุ่มอายุ

วัยเด็ก 1-20 ปี 0

วัยรุ่น 21-45 ปี 73.68%

วัยผู้ใหญ่ 46-60 ปี 21.05%

WARNING มี 4 ราย
ไม่มี 15 ราย


วัยกลางคน 61-70 ปี

วัยสูงอายุ 71-80 ปี 0


วัยชรา 81 ปีขึ้นไป 5.26%

DISEASE โรคทางจิตเภท 1 ราย

ปัจจัยกระตุ้น




วิกฤตชีวิต



การวิเคราะห์สถานการณ์

พยายามฆ่าตัวตาย

รวม 53 ราย



จำแนกเพศ




20
ราย




33
ราย

ปัจจัยกระตุ้น



ปัจจัยกระตุ้นจากสารเสพติด



จำแนกตามกลุ่มอายุ

วัยเด็ก 1-20 ปี **62.26%**

วัยกลางคน 61-70 ปี **1.89%**

วัยรุ่น 21-45 ปี **32.08%**

วัยสูงอายุ 71-80 ปี **1.89%**

วัยผู้ใหญ่ 46-60 ปี **1.89%**

วัยชรา 81 ปีขึ้นไป **0**

ทำร้ายตัวเองด้วยวิธี



กินยาเกินขนาด 31 ราย



แขวนคอ 8 ราย




ใช้ของมีคม/ของแข็ง 10 ราย



ใช้สารพิษ 4 ราย

วิกฤตชีวิต



WARNING

มี 31 ราย

ไม่มี 22 ราย


DISEASE

โรคซึมเศร้า 8 ราย

โรคไตวายเรื้อรัง 1 ราย

ความดันโลหิตสูง 1 ราย

ผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง จนถึงการติดตาม (เฉพาะสมัครใจ)(Retention Rate) เป้าหมาย $\geq$ ร้อยละ 70



จบการนำเสนอ

ขอบคุณ

Thank You

