วาระที่ 3.2 การให้บริการวัคซีนเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจาก Sepsis เขตสุขภาพที่ 8

*วัคซีนนอกเหนือ EPI

*ความเป็นไปได้ในการซื้อร่วม

โดย แพทย์หญิงศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ CSO เขตสุขภาพที่ 8

4 กลุ่มเป้าหมายหลัก ที่มีโอกาสเสียชีวิตสูง

ผู้สูงอายุ ≥ 65 ปี

เน้นภาวะกลืนสำลัก (Aspiration Risk)

ควรประเมิน Swallowing function ทุกราย

Aspiration Prevention Clinic ในทุก รพ. - เชื่อมโยงคลินิกผู้สูงอายุ

โรคเรื้อรัง (NCDs)

เบาหวาน, COPD, โรคไต, โรคหัวใจ

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ยังไม่ได้รับวัคซีน

Influenza Vaccine ทุกปี

Pneumococcal Vaccine (PCV / PPSV23)

เป้าหมาย Coverage ≥ 80%

ผู้ป่วยติดเตียง

กลุ่ม 608 — ระวัง Atypical presentation

อาจไม่มีไข้ แต่ซึมลง กินน้อยลง

อสม. เยี่ยมบ้านสม่ำเสมอ

วัคซีน — Vaccination Strategy

1. รวมจัดซื้อระดับเขต 7 จังหวัด (Pooled Procurement) เพื่อต่อรองราคาและลด Wastage
2. คำนวณความต้องการเทียบกลุ่มเป้าหมาย หากไม่พอ → จัดซื้อเพิ่มระดับเขต
3. วัคซีน : Influenza (ทุกปี) + Pneumococcal (PCV13 / PPSV23) ในกลุ่มเสี่ยง
4. ฉีดก่อนจำหน่าย ในผู้ป่วยที่ยังไม่เคยรับ

"พัฒนา" เผยหลังมติบอ...
https://www.hfocus.org

Hfocus
เจาะลึกระบบสุขภาพ

Monday, 2 March 2026 - 19:57

"พัฒนา" เผยหลังมติบอร์ด สปสช.เคาะฉีด 'วัคซีน IPD' ทั่วประเทศ ชงบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ ประชุมนัดหน้า

ชุดสิทธิประโยชน์ในเด็กอายุ 2,4,12 เดือน จำนวน 4 เข็ม คาดว่าน่าจะเริ่ม พย.2569

ตามที่ Hfocus นำเสนอข้อมูลมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2569 ในวันที่ 2 มี.ค.2569 โดยมีวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2569 ที่ผ่านมา โดยสรุปมติที่ประชุมให้ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมค็อกคัส ชนิดคอนจูเกต (Pneumococcus Conjugated Vaccine; PCV) หรือ “วัคซีน IPD” สำหรับเด็กอายุ 2, 4, 12 เดือน โดยให้ฉีดทั่วประเทศในปีนี้ และนำเข้าอนุกรรมการพิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์ภายใน 1 เดือนและนำเข้าบอร์ดสปสช.ครั้งหน้า

อ่านก่อน! บอร์ดสปสช. ยันมติเดิมฉีด "วัคซีน PCV" ในเด็กเล็ก ตัดนำร่อง เพิ่มขยายทั่วประเทศ

งบ 225 ล้านบาท "เอาอยู่" มั่นใจครอบคลุมเด็กไทยทุกคน

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา เกณฑ์เสี่ยงที่แนะนำฉีดวัคซีน IPD

1) เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (โดยเฉพาะ < 2 ปี)ภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรง ⟶ เสี่ยงติดเชื้อรุนแรง
2) ผู้สูงอายุ≥ 65 ปี (ภูมิคุ้มกันลดลงตามวัย)
3) ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอดเรื้อรัง (COPD, หอบหืด)โรคหัวใจ เบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคตับ
4) ผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำ : ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ได้รับเคมีบำบัด ผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ใช้ยากดภูมิ
5) กลุ่มพิเศษ : ไม่มีม้าม / ม้ามทำงานผิดปกติ เด็กคลอดก่อนกำหนด ผู้สูบบุหรี่จัด

วัคซีน IPD ในผู้ใหญ่ฉีด 1 เข็ม
ปัจจุบันราคา 2,533 บาท/เข็ม ไม่รวมค่าฉีด

📊 ถ้าต้อง

"จัดลำดับความสำคัญแบบงบจำกัด"

เรียงลำดับที่แนะนำ :

1.ภูมิคุ้มกันบกพร่อง + ไม่มีม้าม (เสี่ยงตายสูงสุด)

2.ผู้สูงอายุ ≥ 65 ปี (ภาระโรคสูงสุดในระบบ)

3.โรคเรื้อรังรุนแรง

💡 หลักคิดเชิงนโยบาย

1.เน้น "ลดการเสียชีวิต" มากกว่าการลดการติดเชื้อทั่วไป

2.เลือกกลุ่มที่ Number Needed to Vaccinate (NNV) ต่ำ (ต้องหาข้อมูลเพิ่มจากกรมคร.)

3.ให้ความสำคัญกับกลุ่มที่รักษาแล้วค่าใช้จ่ายสูง

✅ สรุป ถ้างบจำกัด

อันดับ 1 (เชิงคลินิก) : เสี่ยงตายสูงสุด
ภูมิคุ้มกันต่ำ และไม่มีม้าม

อันดับ 1 (เชิงระบบ) : ภาระโรคสูงสุดในระบบ
ผู้สูงอายุ ≥ 65 ปี
แล้วค่อยขยายไปกลุ่มโรคเรื้อรัง

เป้าหมายความครอบคลุมวัคซีน IPD ในผู้สูงอายุ

เขตสุขภาพที่ 8 · ผู้สูงอายุ ≥ 65 ปี · 825,000 คน · ราคา 2,533 บาท/เข็ม

ประชากรทั้งหมด	ผู้สูงอายุ ≥ 65 ปี (15%)	ราคาวัคซีน/เข็ม
5,500,000 คน	**825,000 คน**	**2,533 บาท**

เป้าหมายสูงสุด

100%

จำนวนผู้รับวัคซีน
825,000 คน

งบประมาณที่ต้องการ
2,089.7 ล้านบาท

2,089,725,000 บาท

เป้าหมายแนะนำ

80%

จำนวนผู้รับวัคซีน
660,000 คน

งบประมาณที่ต้องการ
1,671.8 ล้านบาท

1,671,780,000 บาท

เริ่มต้นขั้นต่ำ

50%

จำนวนผู้รับวัคซีน
412,500 คน

งบประมาณที่ต้องการ
1,044.9 ล้านบาท

1,044,862,500 บาท